

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Cuplaton 317,5 mg/ml suukaudsed tilgad, emulsioon Simetikoon

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama ravimit Cuplaton täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cuplaton ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cuplaton'i võtmist
3. Kuidas Cuplaton'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cuplaton'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CUPLATON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cuplaton suukaudsete tilgade toimeaine simetikoon lagundab gaasimullid vähendades pindpinevust ning hõlbustab seega gaaside eritumist. Cuplaton leevendab kõhupuhitust ja sellest tingitud valulikkust. Simetikoon ei imendu seedetraktist.

Cuplatoni kasutatakse:

- Kõhupuhituse (üleliigne gaas maos ja sooles) sümptomaatiliseks raviks.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CUPLATON'I KASUTAMIST

Ärge võtke Cuplaton'i:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) simetikooni või Cuplaton'i mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Cuplaton'il koostoimed teiste ravimitega puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Cuplaton'i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna simetikoon ei läbi platsentaarbarjääri ja ei eritu rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Simetikoon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

3. KUIDAS VÕTTA CUPLATON'I

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:

- Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.
- Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4 korda ööpäevas.

Lastele:

0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute (tugevad valuhood) raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku segatuna enne iga söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:

Vanus	Annus
½...1 aastased	1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased	1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased	2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased	3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased	4 tilka 4 korda ööpäevas

1 ml = 35 tilka.

Enne kasutamist loksutada.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Cuplaton'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Cuplaton'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate Cuplaton'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuplaton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Simetikooni kasutamisel on väga harva teatatud allergilistest nähtudest, nagu lööbest ja urtikaariast (nõgestõbi).

Harva on teatatud ka seedetrakti nähtudest, nagu kõhuvalust ja kõhu puhitusest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CUPLATON'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamiseks eritingimusi.

Ärge kasutage Cuplaton'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cuplaton sisaldab

- Toimeaine on simetikoon. 1 ml sisaldab 317,5 mg simetikooni.
- Abiained on glütseroolmonostearaat, poliüksüetüleen (100) stearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, sorbiinhape, naatriumsahhariin, ja puhastatud vesi.

Kuidas Cuplaton välja näeb ja pakendi sisu

Valge või kollakas emulsioon.

30 ml plastikpudelis

Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47 ,
11316 Tallinn

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2011