

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Disperin, 500 mg tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Disperin`i täpselt juhiste järgi vastavalt.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Disperin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Disperin`i kasutamist
3. Kuidas Disperin`i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Disperin`i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DISPERIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Disperin`is sisalduv atsetüülsalitsüülhape alandab palavikku ja leevendab valu ning põletikku.

Disperin`i kasutatakse erinevatest põhjustest tulenevate valude ning palaviku- ja reumaatiliste haiguste raviks (nt. peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalud, lihase- ja liigesevalud, külmetushaigused).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DISPERIN`I KASUTAMIST

Ärge kasutage Disperin`i

- kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või Disperin`i mõne koostisosa suhtes
- kui teil on seedetrakti värske haavand
- kui teil on kalduvus verejooksudele (nt. veritsustõbi või vereliistakute vähesus)
- kui teil on raske neerupuudulikkus
- kui te põete astmat ja sümptomid süvenevad valuvaigistite kasutamisel
- kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt esilekutsutud astmakui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;
- kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Disperin

Konsulteerige oma arstiga enne ravi kasutamist

- kui olete alla 18-aastane laps või nooruk. Palavikuga kulgevat viirusinfektsioonide korral võivad atsetüülsalitsüülhappe preparaadid suurendada Reye sündroomi tekke riski. Selle nähtude hulka kuuluvad muuhulgas teadvushäired, maksafunktsiooni häired ja kauakestev oksendamine.
- kui teil on või on varasemalt olnud seedetrakti haavand

- kui teil on astma, nõgestõbi (urtikaaria) või ninapolüübid
- kui teil on maksa-, neeru- või südamepuudulikkus
- kui teil on tulemas operatsioon (ravimi võtmine tuleb lõpetada mitu päeva enne lõikust)
- kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi
- kui te olete rase (esimene ja teine kolmandik) või imetate last
- kui teil on kusihaape eritumise häired (juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhaape kusihaape eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihaape eritumise häired).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja loodustooteid.

Mõnede ravimite või Disperini toime võib muutuda või teil võivad tekkida kõrvaltoimeid, kui te kasutate allpool mainitud ravimeid samaaegselt. Sellised ravimid on näiteks:

- teatud verehüübimist takistavad ravimid (nt varfariin, hepariin)
- kortikosteroidid
- muud põletikuvastased ravimid
- teatud reumaravimid (metotreksaat)
- diureetikumid ja teised vererõhuravimid (AKE-inhibiitorid, AT-II-retseptori antagonistid)
- depressiooniravimid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid SSTI)
- teatud diabeediravimid (sulfonüüluurea preparaadid)
- teatud südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim (digoksiin)
- teatud epilepsiaravimid (fenütoiin, valproaat)
- teatud podagraravimid (probenetsiid)
- teatud silmarõhuravimid (asetatsoolamiid)

Ärge unustage mainida arstile, et te kasutate Disperin'i.

Disperin'i kasutamine koos toidu ja joogiga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Disperin'i kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib atsetüülsalitsüülhapet kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Disperin'i kasutada.

Atsetüülsalitsüülhaape eritub rinnapiima. Juhendi kohaseid annuseid kasutades ei põhjusta ravim lapsele kahjulikke kõrvaltoimeid. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Disperin ei mõjuta autojuhtimise võimet.

3. KUIDAS DISPERSIN'I KASUTADA

Tablett tuleb võtta koos piisava vedelikuga (nt klaas vett) ja soovitatavalt söögi ajal.

Täiskasvanud

Erinevatest põhjustest tulenevate valude ja palaviku korral 500...1000 mg kuni 3 korda ööpäevas.

Reumaatiliste põletike korral on annus individuaalne, tavaliselt 3000...5000 mg ööpäevas jagatuna 3...4 annuseks.

Ravimi pikaajaline kasutamine toimub ainult arsti ettekirjutuse kohaselt.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid - vt Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Disperin.

Üle 12-aastased lapsed 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Manustada mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Alla 12-aastastele lastele ei sobi Disperin toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12-aastastele lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.

Kui te võtate Disperin'i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui võtate (või keegi teine võtab) kogemata liiga suure annuse ravimit. Esmaabiks võib manustada ravisütt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Disperin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: kõhuvalu ja iiveldus, seedetrakti haavandid, mis võivad põhjustada verejookse. Kuna atsetüülsalitsüülhape takistab vere hüübimist, võivad haavad veritseda tavalisest kauem.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: kõhulahtisus või allergiline lööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed: allergilised reaktsioonid (nt õhupuudus, allergiline nohu või nõgestõbi), veresüsteemi häired (aneemia, aplastiline aneemia, trombotsütopeenia, agranulotsütoos, hüpoprotromineemia), seedetrakti stenoos, maksakahjustus ja maksaensüümide aktiivsuse tõus, Reye sündroom, nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni või Lyelli sündroom, multiformne erüteem, purpur, nodoosne erüteem, hemorraagiline vaskuliit), neerutalitluse häired, vedelikupeetus

Teiste valuvaigistite suhtes allergilised patsiendid (kellel esineb lööve või õhupuudus) võivad olla ülitundlikud ka Disperin'i suhtes. Disperin võib põhjustada turseid patsientidel, kes põevad neeru- või südamepuudulikkust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS DISPERRIN'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Purk:

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Disperin'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Disperin sisaldab

Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape.

Abiained on alumiiniumatsetaat, raske magneesiumoksiid, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, talk, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid ja küllastamata taimeõli.

Kuidas Disperin välja näeb ja pakendi sisu

Disperin on valge või peaaegu valge, ümmargune, sile, diagonaalsete servadega, ilma poolitusjooneta, katteta tablett, diameeter 13 mm.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome

Tootja

Orion Corporation
Orion Pharma
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel/fax 66 44 551

Infoleht on viimati koostöölstatud septembris 2010